

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO

BRASIL¹



Indicadores demográficos, 2013

Población total	200,362 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	75 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) ²	65 años (10 años menos que la EVN)
Mediana de edad	30 años
Esperanza de vida mayores 60 años	22 años
Población mayor de 60 años	11% (22,040 mil habitantes)

Indicadores macroeconómicos, 2013

PIB per cápita por PPA	16,032 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	1,454 dólares
Gasto total en salud % del PIB	9.7%
<i>Gasto Público en salud</i>	4.7%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	2.9%
<i>Otros</i>	2.1%

Indicadores de Desarrollo Humano, 2013

Índice de Desarrollo Humano	0,744 (Desarrollo Humano Alto, lugar 79 de 187)
IDH ajustado por desigualdad	0,542
Coefficiente de Gini 2012	54.7 (Óptimo, menor a 39.0)

Causas de defunción, 2012

Enfermedades transmisibles	13.5%
Enfermedades no transmisibles	74.7%
Traumatismos	11.8%

Principales causas de defunción, 2010

Causa	Defunciones	Porcentaje relativo
1. Enfermedades isquémicas del corazón	162,132	24.2
2. Infarto cerebral	141,074	21.1
3. Infecciones respiratorias bajas	65,534	9.8
4. Violencia interpersonal	60,534	9.0
5. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)	54,038	8.1
6. Diabetes	53,699	8.0
7. Accidentes automotores	43,985	6.6
8. Enfermedades hipertensivas del corazón	34,157	5.1
9. Cirrosis	29,075	4.3
10. Insuficiencia Renal Crónica	25,499	3.8
Total 10 principales causas de muerte	669,727	100%

¹ Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas sanitarias Mundiales, OMS

² EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con “total salud”, contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crec. 2010/1990	Porcentaje 2010
<i>Años de vida saludable perdidos (AVISA)</i>	34,346,358	40,749,490	18.6%	100.0
<i>Años vividos con discapacidad (AVD)</i>	5,449,755	8,109,955	48.8%	19.9
<i>Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)</i>	28,896,603	32,639,535	12.9%	80.1
<i>Defunciones</i>	900,369	1,370,896	52.2%	

Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010		Crecimiento de defunciones por factores de riesgo 2010 vs 1990	
1. <i>Riesgos fisiológicos</i>	32%	1. Consumo de alcohol y drogas	96%
2. <i>Riesgos dietarios</i>	15%	• <i>Consumo de alcohol</i>	98%
3. <i>Lesiones</i>	14%	• <i>Consumo de drogas</i>	82%
4. <i>Consumo de alcohol y drogas</i>	13%	2. Riesgos fisiológicos	73%
5. <i>Consumo de tabaco</i>	8%	• <i>Sobrepeso y obesidad</i>	156%
6. <i>Inactividad física</i>	5%	• <i>Alta glucosa en ayuno</i>	119%
7. <i>Riesgos laborales</i>	4%	3. Lesiones	45%
8. <i>Otros riesgos</i>	9%	• <i>Accidentes automotores</i>	41%
	100%	• <i>Violencia interpersonal</i>	45%

Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>Menores de 5 años</i>	1. <i>Deficiencia de zinc</i>	1. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	2. <i>Bajo peso para la edad</i>	2. <i>Anomalías congénitas</i>
	3. <i>Consumo de tabaco</i>	3. <i>Ahogamientos</i>
	4. <i>Lactancia materna sub-óptima</i>	4. <i>Accidentes automotores</i>
	5. <i>Deficiencia de vitamina A</i>	5. <i>Enfermedad diarreica</i>
	6. <i>Contaminación del aire en el hogar</i>	6. <i>Meningitis</i>
	7. <i>Consumo de alcohol</i>	7. <i>Leucemia</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>5 a 14 años</i>	1. <i>Consumo de alcohol</i>	1. <i>Accidentes automotores</i>
	2. <i>Deficiencia de hierro</i>	2. <i>Ahogamientos</i>
	3. <i>Consumo de drogas</i>	3. <i>Violencia interpersonal</i>
	4. <i>Falta de saneamiento</i>	4. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	5. <i>Abuso sexual infantil</i>	5. <i>Leucemia</i>
	6. <i>Falta de agua potable</i>	6. <i>Cáncer cerebral</i>
		7. <i>Anomalías congénitas</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>15 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos dietarios 3. Alta presión arterial 4. Sobrepeso y obesidad 5. Consumo de tabaco 6. Riesgos laborales 7. Inactividad física 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia interpersonal 2. Accidentes automotores 3. VIH/SIDA 4. Enfermedades isquémicas del corazón 5. Infarto cerebral 6. Cirrosis 7. Autolesiones

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Alta presión arterial 3. Consumo de tabaco 4. Sobrepeso y obesidad 5. Altos niveles de glucosa en la sangre 6. Inactividad física 7. Consumo de alcohol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades isquémicas del corazón 2. Infarto cerebral 3. Diabetes 4. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 5. Cirrosis 6. Infecciones respiratorias bajas 7. Cáncer de pulmón

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alta presión arterial 2. Riesgos dietarios 3. Sobrepeso y obesidad 4. Consumo de tabaco 5. Altos niveles de glucosa en la sangre 6. Inactividad física 7. Altos niveles de colesterol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades isquémicas del corazón 2. Infarto cerebral 3. Infecciones respiratorias bajas 4. Diabetes 5. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 6. Enfermedades hipertensivas del corazón 7. Otras enfermedades cardiovasculares y circulatorias