

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO

CHILE<sup>1</sup>



**Indicadores demográficos, 2013**

Población total	17,620 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	80 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) <sup>2</sup>	70 años (10 años menos que la EVN)
Mediana de edad	33 años
Esperanza de vida mayores 60 años	24 años
Población mayor de 60 años	14% (2,467 mil habitantes)

**Indicadores macroeconómicos, 2013**

PIB per cápita por PPA	21,913 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	1,678 dólares
Gasto total en salud % del PIB	<b>7.6%</b>
<i>Gasto Público en salud</i>	3.6%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	2.4%
<i>Otros</i>	1.6%

**Indicadores de Desarrollo Humano, 2013**

Índice de Desarrollo Humano	0,822 (Desarrollo Humano Alto, lugar 41 de 187)
IDH ajustado por desigualdad	0,661
Coefficiente de Gini 2012	52.1 (Óptimo, menor a 39.0)

**Causas de defunción, 2012**

Enfermedades transmisibles	8.1%
Enfermedades no transmisibles	82.7%
Traumatismos	9.2%

**Principales causas de defunción, 2010**

Causa	Defunciones	Porcentaje relativo
1. Enfermedades isquémicas del corazón	11,216	22.9%
2. Infarto cerebral	9,517	19.4%
3. Infecciones respiratorias bajas	5,172	10.6%
4. Cirrosis	4,082	8.3%
5. Enfermedad del Alzheimer	3,848	7.9%
6. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)	3,506	7.2%
7. Cáncer de estómago	3,445	7.0%
8. <b>Diabetes</b>	<b>2,895</b>	<b>5.9%</b>
9. <b>Insuficiencia Renal Crónica</b>	<b>2,764</b>	<b>5.6%</b>
10. Cáncer de pulmón	2,526	5.2%
<b>Total 10 principales causas de muerte</b>	<b>48,971</b>	<b>100%</b>

<sup>1</sup> Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas sanitarias Mundiales, OMS

<sup>2</sup> EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con "total salud", contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

### Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
<b>Años de vida saludable perdidos (AVISA)</b>	<b>1,926,963</b>	<b>2,313,541</b>	<b>20.0%</b>	<b>100.0%</b>
<i>Años vividos con discapacidad (AVD)</i>	272,155	594,465	118%	25.7%
<i>Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)</i>	1,654,808	1,719,076	3.8%	74.3%
<i>Defunciones</i>	76,578	91,852	19.9%	

### Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 37%	1. <b>Riesgo fisiológico</b> 30%
2. <i>Riesgos dietarios</i> 15%	• <i>Sobrepeso y obesidad</i> 97%
3. <i>Consumo de alcohol y drogas</i> 13%	• <i>Alta glucosa en la sangre</i> 41%
4. <i>Consumo de tabaco</i> 11%	• <i>Baja densidad mineral ósea</i> 33%
5. <i>Lesiones</i> 7%	2. <b>Lesiones</b> 17%
6. <i>Inactividad física</i> 5%	• <i>Violencia interpersonal</i> -18%
7. <i>Riesgos laborales</i> 5%	• <i>Accidentes automotores</i> 56%
8. <i>Otros riesgos</i> 7%	3. <b>Riesgos dietarios</b> 7%
<b>Total</b> 100%	4. <b>Consumo de tabaco</b> 4%

### Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

	Factores de riesgo	Causas de defunción
Menores de 5 años	1. <i>Consumo de tabaco</i>	1. <i>Anomalías congénitas</i>
	2. <i>Deficiencia de zinc</i>	2. <i>Accidentes automotores</i>
	3. <i>Lactancia materna sub-óptima</i>	3. <i>Ahogamiento</i>
	4. <i>Consumo de alcohol</i>	4. <i>Fuego</i>
	5. <i>Contaminación del aire en el hogar</i>	5. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	6. <i>Bajo peso para la edad</i>	6. <i>Leucemia</i>
	7. <i>Consumo de drogas</i>	7. <i>Fiebre tifoidea</i>

	Factores de riesgo	Causas de defunción
5 a 9 años	1. <i>Consumo de alcohol</i>	1. <i>Accidentes automotores</i>
	2. <i>Consumo de drogas</i>	2. <i>Leucemia</i>
	3. <i>Deficiencia de hierro</i>	3. <i>Anomalías congénitas</i>
	4. <i>Falta de agua potable</i>	4. <i>Fuego</i>
	5. <i>Falta de saneamiento</i>	5. <i>Fiebre tifoidea</i>
	6. <i>Abuso sexual infantil</i>	6. <i>Ahogamiento</i>
		7. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>10 a 14 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Abuso sexual infantil</li> <li>3. Consumo de drogas</li> <li>4. Deficiencia de hierro</li> <li>5. Falta de agua potable</li> <li>6. Falta de saneamiento</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accidentes automotores</li> <li>2. Autolesiones</li> <li>3. Leucemia</li> <li>4. Anomalías congénitas</li> <li>5. Ahogamiento</li> <li>6. Fiebre tifoidea</li> <li>7. Violencia interpersonal</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>15 a 19 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos laborales</li> <li>3. Violencia de pareja</li> <li>4. Abuso sexual infantil</li> <li>5. Consumo de drogas</li> <li>6. Deficiencia de hierro</li> <li>7. Falta de agua potable</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autolesiones</li> <li>2. Accidentes automotores</li> <li>3. Violencia interpersonal</li> <li>4. Ahogamiento</li> <li>5. Leucemia</li> <li>6. Anomalías congénitas</li> <li>7. Fuerzas de la naturaleza</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>20 a 24 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos laborales</li> <li>3. Consumo de drogas</li> <li>4. Violencia de pareja</li> <li>5. Abuso sexual infantil</li> <li>6. Deficiencia de hierro</li> <li>7. Falta de agua potable</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autolesiones</li> <li>2. Accidentes automotores</li> <li>3. Violencia interpersonal</li> <li>4. Ahogamiento</li> <li>5. Fuerzas de la naturaleza</li> <li>6. Leucemia</li> <li>7. VIH/SIDA</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>25 a 29 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos laborales</li> <li>3. Riesgos dietarios</li> <li>4. Consumo de drogas</li> <li>5. Alta presión arterial</li> <li>6. Sobrepeso y obesidad</li> <li>7. Violencia de pareja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autolesiones</li> <li>2. Accidentes automotores</li> <li>3. Violencia interpersonal</li> <li>4. VIH/SIDA</li> <li>5. Ahogamiento</li> <li>6. Fuerzas de la naturaleza</li> <li>7. Enfermedades isquémicas del corazón</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>30 a 34 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos laborales</li> <li>3. Riesgos dietarios</li> <li>4. Consumo de tabaco</li> <li>5. Alta presión arterial</li> <li>6. Sobrepeso y obesidad</li> <li>7. Consumo de drogas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autolesiones</li> <li>2. Accidentes automotores</li> <li>3. Violencia interpersonal</li> <li>4. VIH/SIDA</li> <li>5. Cirrosis</li> <li>6. Enfermedades isquémicas del corazón</li> <li>7. Infarto cerebral</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>35 a 39 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos dietarios</li> <li>3. Riesgos laborales</li> <li>4. Consumo de tabaco</li> <li>5. Alta presión arterial</li> <li>6. Sobrepeso y obesidad</li> <li>7. Inactividad física</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autolesiones</li> <li>2. Accidentes automotores</li> <li>3. Cirrosis</li> <li>4. VIH/SIDA</li> <li>5. Violencia interpersonal</li> <li>6. Enfermedades isquémicas del corazón</li> <li>7. Infarto cerebral</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>40 a 44 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos dietarios</li> <li>3. Consumo de tabaco</li> <li>4. Sobrepeso y obesidad</li> <li>5. Alta presión arterial</li> <li>6. Riesgos laborales</li> <li>7. Inactividad física</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cirrosis</li> <li>2. Autolesiones</li> <li>3. Accidentes automotores</li> <li>4. Enfermedades isquémicas del corazón</li> <li>5. Infarto cerebral</li> <li>6. Violencia interpersonal</li> <li>7. VIH/SIDA</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>45 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riesgos dietarios</li> <li>2. Consumo de alcohol</li> <li>3. Alta presión arterial</li> <li>4. Consumo de tabaco</li> <li>5. Sobrepeso y obesidad</li> <li>6. Inactividad física</li> <li>7. Altos niveles de glucosa en la sangre</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cirrosis</li> <li>2. Enfermedades isquémicas del corazón</li> <li>3. Autolesiones</li> <li>4. Accidentes automotores</li> <li>5. Infarto cerebral</li> <li>6. Cáncer de mama</li> <li>7. Cáncer de estómago</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riesgos dietarios</li> <li>2. Alta presión arterial</li> <li>3. Consumo de tabaco</li> <li>4. Sobrepeso y obesidad</li> <li>5. Consumo de alcohol</li> <li>6. Altos niveles de glucosa en la sangre</li> <li>7. Inactividad física</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enfermedades isquémicas del corazón</li> <li>2. Cirrosis</li> <li>3. Infarto cerebral</li> <li>4. Cáncer de estómago</li> <li>5. Cáncer de pulmón</li> <li>6. Cáncer de vesícula</li> <li>7. Diabetes</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alta presión arterial</li> <li>2. Riesgos dietarios</li> <li>3. Sobrepeso y obesidad</li> <li>4. Consumo de tabaco</li> <li>5. Altos niveles de glucosa en la sangre</li> <li>6. Inactividad física</li> <li>7. Altos niveles de colesterol</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enfermedades isquémicas del corazón</li> <li>2. Infarto cerebral</li> <li>3. Infecciones respiratorias bajas</li> <li>4. Alzheimer</li> <li>5. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica</li> <li>6. Diabetes</li> <li>7. Insuficiencia Renal Crónica</li> </ol>