

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO

ECUADOR<sup>1</sup>



**Indicadores demográficos, 2013**

Población total	15,738 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	76 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) <sup>2</sup>	66 años (10 años menos que la EVN)
Mediana de edad	26 años
Esperanza de vida mayores 60 años	22 años
Población mayor de 60 años	10% (1,574 mil habitantes)

**Indicadores macroeconómicos, 2013**

PIB per cápita por PPA	10,890 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	789 dólares
Gasto total en salud % del PIB	<b>7.5%</b>
<i>Gasto Público en salud</i>	3.9%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	3.4%
<i>Otros</i>	0.2%

**Indicadores de Desarrollo Humano, 2013**

Índice de Desarrollo Humano	0,711 (Desarrollo Humano Alto, lugar 98 de 187)
IDH ajustado por desigualdad	0,549
Coefficiente de Gini 2012	49.3 (Óptimo, menor a 39.0)

**Causas de defunción 2012**

Enfermedades transmisibles	16.4%
Enfermedades no transmisibles	69.4%
Traumatismos	14.2%

**Principales causas de defunción, 2010**

Causa	Defunciones	Porcentaje relativo
1. Enfermedades isquémicas del corazón	6,656	19.4%
2. infecciones respiratorias bajas	5,021	14.6%
3. Infarto cerebral	4,950	14.4%
4. Accidentes automotores	3,498	10.2%
5. <b>Insuficiencia Renal Crónica</b>	<b>2,944</b>	<b>8.6%</b>
6. <b>Diabetes</b>	<b>2,761</b>	<b>8.0%</b>
7. Violencia interpersonal	2,582	7.5%
8. Cirrosis	2,062	6.0%
9. Cáncer de estómago	2,005	5.8%
10. Enfermedades hipertensivas cardiovasculares	1,840	5.4%
<b>Total 10 principales causas de muerte</b>	<b>34,319</b>	<b>100%</b>

<sup>1</sup> Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas sanitarias Mundiales, OMS

<sup>2</sup> EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con "total salud", contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

### Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
<b>Años de vida saludable perdidos (AVISA)</b>	<b>1,842,486</b>	<b>2,002,007</b>	<b>8.7%</b>	<b>100.0%</b>
Años vividos con discapacidad (AVD)	319,928	518,732	62.1%	25.9%
Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)	1,522,558	1,483,275	-2.5%	74.1%
Defunciones	39,854	57,019	43.1%	

### Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. Riesgos fisiológicos 27%	1. Consumo de alcohol y drogas 146%
2. Consumo de alcohol y drogas 16%	• Consumo de drogas 243%
3. Lesiones 16%	• Consumo de alcohol 138%
4. Riesgos dietarios 11%	2. Riesgos fisiológicos 79%
5. Desnutrición 11%	• Sobrepeso y obesidad 139%
6. Consumo de tabaco 5%	• Alta glucosa en la sangre 93%
7. Inactividad física 4%	3. Lesiones 60%
8. Otros riesgos 10%	• Violencia interpersonal 82%
<b>Total 100%</b>	• Accidentes automotores 50%
	4. Riesgos dietarios 55%

### Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

	Factores de riesgo	Causas de defunción
Menores de 5 años	1. Bajo peso para la edad	1. Infecciones respiratorias bajas
	2. Deficiencia de zinc	2. Accidentes automotores
	3. Consumo de tabaco (directo e indirecto)	3. Enfermedades diarreicas
	4. Lactancia materna sub-óptima	4. Anomalías congénitas
	5. Deficiencia de vitamina A	5. Ahogamientos
	6. Deficiencia de hierro	6. Desnutrición
	7. Consumo de drogas	7. Leucemia

	Factores de riesgo	Causas de defunción
5 a 9 años	1. Consumo de alcohol	1. Accidentes automotores
	2. Deficiencia de hierro	2. Infecciones respiratorias bajas
	3. Consumo de drogas	3. Ahogamiento
	4. Falta de saneamiento	4. Leucemia
	5. Falta de agua potable	5. Anomalías congénitas
	6. Abuso sexual infantil	6. Enfermedad diarreica
		7. Violencia interpersonal

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>10 a 14 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Deficiencia de hierro</li> <li>3. Consumo de drogas</li> <li>4. Abuso sexual infantil</li> <li>5. Falta de saneamiento</li> <li>6. Falta de agua potable</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accidentes automotores</li> <li>2. Ahogamiento</li> <li>3. Autolesiones</li> <li>4. Infecciones respiratorias bajas</li> <li>5. Leucemia</li> <li>6. Violencia interpersonal</li> <li>7. Anomalías congénitas</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>15 a 19 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Violencia de pareja</li> <li>3. Riesgos laborales</li> <li>4. Consumo de drogas</li> <li>5. Abuso sexual infantil</li> <li>6. Deficiencia de hierro</li> <li>7. Falta de saneamiento</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accidentes automotores</li> <li>2. Violencia interpersonal</li> <li>3. Autolesiones</li> <li>4. Ahogamiento</li> <li>5. Infecciones respiratorias bajas</li> <li>6. Leucemia</li> <li>7. Enfermedad isquémica del corazón</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>20 a 24 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos laborales</li> <li>3. Violencia de pareja</li> <li>4. Consumo de drogas</li> <li>5. Abuso sexual infantil</li> <li>6. Deficiencia de hierro</li> <li>7. Falta de Saneamiento</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Violencia interpersonal</li> <li>2. Accidentes automotores</li> <li>3. Autolesiones</li> <li>4. Ahogamiento</li> <li>5. Infecciones respiratorias bajas</li> <li>6. Enfermedad isquémica del corazón</li> <li>7. Tuberculosis</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>25 a 29 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos dietarios</li> <li>3. Alta presión arterial</li> <li>4. Sobrepeso y obesidad</li> <li>5. Riesgos laborales</li> <li>6. Consumo de drogas</li> <li>7. Inactividad física</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Violencia interpersonal</li> <li>2. Accidentes automotores</li> <li>3. VIH/SIDA</li> <li>4. Autolesiones</li> <li>5. Enfermedad isquémica del corazón</li> <li>6. Infecciones respiratorias bajas</li> <li>7. Ahogamiento</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>30 a 34 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos dietarios</li> <li>3. Sobrepeso y obesidad</li> <li>4. Alta presión arterial</li> <li>5. Riesgos laborales</li> <li>6. Consumo de tabaco</li> <li>7. Consumo de drogas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Violencia interpersonal</li> <li>2. Accidentes automotores</li> <li>3. VIH/SIDA</li> <li>4. Autolesiones</li> <li>5. Enfermedad isquémica del corazón</li> <li>6. Infarto cerebral</li> <li>7. Tuberculosis</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>35 a 39 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos dietarios</li> <li>3. Sobrepeso y obesidad</li> <li>4. Alta presión arterial</li> <li>5. Consumo de tabaco</li> <li>6. Inactividad física</li> <li>7. Altos niveles de glucosa en la sangre</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIH/SIDA</li> <li>2. Violencia interpersonal</li> <li>3. Accidentes automotores</li> <li>4. Enfermedad isquémica del corazón</li> <li>5. Autolesiones</li> <li>6. Infarto cerebral</li> <li>7. Cirrosis</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>40 a 44 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos dietarios</li> <li>3. Sobrepeso y obesidad</li> <li>4. Alta presión arterial</li> <li>5. Consumo de tabaco</li> <li>6. Altos niveles de glucosa en la sangre</li> <li>7. Inactividad física</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIH/SIDA</li> <li>2. Accidentes automotores</li> <li>3. Violencia interpersonal</li> <li>4. Enfermedad isquémica del corazón</li> <li>5. Cirrosis</li> <li>6. Infarto cerebral</li> <li>7. Infección renal crónica</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>45 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos dietarios</li> <li>3. Alta presión arterial</li> <li>4. Sobrepeso y obesidad</li> <li>5. Altos niveles de glucosa en la sangre</li> <li>6. Inactividad física</li> <li>7. Consumo de tabaco</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accidentes automotores</li> <li>2. VIH/SIDA</li> <li>3. Enfermedades isquémicas del corazón</li> <li>4. Violencia interpersonal</li> <li>5. Infarto cerebral</li> <li>6. Cirrosis</li> <li>7. Infección renal crónica</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riesgos dietarios</li> <li>2. Alta presión arterial</li> <li>3. Sobrepeso y obesidad</li> <li>4. Altos niveles de glucosa en la sangre</li> <li>5. Consumo de alcohol</li> <li>6. Inactividad física</li> <li>7. Consumo de tabaco</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enfermedades isquémicas del corazón</li> <li>2. Infarto cerebral</li> <li>3. Insuficiencia Renal Crónica</li> <li>4. Diabetes</li> <li>5. Cirrosis</li> <li>6. Accidentes automotores</li> <li>7. Cáncer de estómago</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alta presión arterial</li> <li>2. Riesgos dietarios</li> <li>3. Altos niveles de glucosa en la sangre</li> <li>4. Sobrepeso y obesidad</li> <li>5. Consumo de tabaco</li> <li>6. Inactividad física</li> <li>7. Plomo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enfermedades isquémicas del corazón</li> <li>2. Infarto cerebral</li> <li>3. Diabetes</li> <li>4. Insuficiencia Renal Crónica</li> <li>5. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)</li> <li>6. Enfermedades hipertensivas del corazón</li> <li>7. Cáncer del estómago</li> </ol>