

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO

EL SALVADOR¹



Indicadores demográficos, 2013

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Población total | 6,340 mil habitantes |
| Esperanza de vida al nacer (EVN) | 73 años |
| Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) ² | 63 años (10 años menos que la EVN) |
| Mediana de edad | 24 años |
| Esperanza de vida mayores 60 años | 22 años |
| Población mayor de 60 años | 10% (634 mil habitantes) |

Indicadores macroeconómicos, 2013

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| PIB per cápita por PPA | 7,764 dólares |
| Gasto per cápita en salud por PPA | 539 dólares |
| Gasto total en salud % del PIB | 6.9% |
| <i>Gasto Público en salud</i> | 4.6% |
| <i>Gasto de bolsillo en salud</i> | 2.0% |
| <i>Otros</i> | 0.3% |

Indicadores de Desarrollo Humano, 2013

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Índice de Desarrollo Humano | 0,662 (Desarrollo Humano Alto, lugar 115 de 187) |
| IDH ajustado por desigualdad | 0,485 |
| Coefficiente de Gini 2012 | 48.3 (Óptimo, menor a 39.0) |

Causas de defunción, 2012

| | |
|-------------------------------|-------|
| Enfermedades transmisibles | 13.2% |
| Enfermedades no transmisibles | 65.2% |
| Traumatismos | 21.6% |

Principales causas de defunción, 2010

| Causa | Defunciones | Porcentaje relativo |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 1. Enfermedades isquémicas del corazón | 5,953 | 26.0% |
| 2. Violencia interpersonal | 4,212 | 18.4% |
| 3. infecciones respiratorias bajas | 2,629 | 11.5% |
| 4. Infarto cerebral | 1,960 | 8.6% |
| 5. Diabetes | 1,823 | 8.0% |
| 6. Insuficiencia Renal Crónica | 1,589 | 6.9% |
| 7. Accidentes automotores | 1,589 | 6.9% |
| 8. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) | 1,297 | 5.7% |
| 9. Cirrosis | 1,087 | 4.8% |
| 10. Cáncer de estómago | 740 | 3.2% |
| Total 10 principales causas de muerte | 22,879 | 100% |

¹ Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas sanitarias Mundiales, OMS

² EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con "total salud", contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

Impacto de factores de riesgos

| Concepto | 1990 | 2010 | Crecimiento | Porcentaje 2010 |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Años de vida saludable perdidos (AVISA) | 1,146,065 | 1,097,084 | -4.3% | 100.0% |
| <i>Años vividos con discapacidad (AVD)</i> | 147,937 | 181,557 | 22.7% | 16.5% |
| <i>Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)</i> | 998,128 | 915,527 | -8.3% | 83.5% |
| <i>Defunciones</i> | 26,868 | 37,059 | 37.9% | |

Impacto de los principales riesgos prevenibles

| Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010 | Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Lesiones 27% | 1. Riesgo fisiológico 92% |
| 2. Riesgos fisiológicos 27% | • <i>Sobrepeso y obesidad</i> 208% |
| 3. Consumo de alcohol y drogas 13% | • <i>Alta glucosa en ayuno</i> 119% |
| 4. Riesgos dietarios 11% | • <i>Baja densidad mineral ósea</i> 80% |
| 5. Desnutrición 5% | 2. Consumo de alcohol y drogas 46% |
| 6. Otros riesgos 17% | • <i>Consumo de alcohol</i> 53% |
| Total 100% | 3. Lesiones 37% |
| | • <i>Violencia interpersonal</i> 51% |

Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Menores de 5 años</i> | 1. <i>Bajo peso para la edad</i> | 1. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> |
| | 2. <i>Deficiencia de zinc</i> | 2. <i>Anomalías congénitas</i> |
| | 3. <i>Contaminación del aire en el hogar</i> | 3. <i>Enfermedades diarreicas</i> |
| | 4. <i>Consumo de tabaco (directo e indirecto)</i> | 4. <i>Accidentes automotores</i> |
| | 5. <i>Lactancia materna sub-óptima</i> | 5. <i>Violencia interpersonal</i> |
| | 6. <i>Consumo de alcohol</i> | 6. <i>VIH/SIDA</i> |
| | 7. <i>Deficiencia de vitamina A</i> | 7. <i>Ahogamientos</i> |
| | | 8. <i>Malnutrición</i> |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>5 a 9 años</i> | 1. <i>Consumo de alcohol</i> | 1. <i>Accidentes automotores</i> |
| | 2. <i>Deficiencia de hierro</i> | 2. <i>Violencia interpersonal</i> |
| | 3. <i>Falta de agua potable</i> | 3. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> |
| | 4. <i>Consumo de drogas</i> | 4. <i>Anomalías congénitas</i> |
| | 5. <i>Falta de saneamiento</i> | 5. <i>Ahogamiento</i> |
| | 6. <i>Abuso sexual infantil</i> | 6. <i>Leucemia</i> |
| | | |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>10 a 14 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Deficiencia de hierro 3. Abuso sexual infantil 4. Consumo de drogas 5. Falta de agua potable 6. Falta de saneamiento | <ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia interpersonal 2. Accidentes automotores 3. Ahogamiento 4. Infecciones respiratorias bajas 5. Leucemia 6. Autolesiones 7. Anomalías congénitas |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>15 a 19 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Violencia de pareja 3. Riesgos laborales 4. Abuso sexual infantil 5. Consumo de drogas 6. Deficiencia de hierro 7. Falta de agua potable | <ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia interpersonal 2. Accidentes automotores 3. Autolesiones 4. Ahogamiento 5. Enfermedad isquémica del corazón 6. Infecciones respiratorias bajas 7. Leucemia |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>20 a 24 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos laborales 3. Violencia de pareja 4. Consumo de drogas 5. Abuso sexual infantil 6. Deficiencia de hierro 7. Falta de Saneamiento | <ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia interpersonal 2. Accidentes automotores 3. Autolesiones 4. Ahogamiento 5. Enfermedad isquémica del corazón 6. VIH/SIDA 7. Infecciones respiratorias bajas |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>25 a 29 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos dietarios 3. Sobrepeso y obesidad 4. Alta presión arterial 5. Riesgos laborales 6. Altos niveles de glucosa en la sangre 7. Inactividad física | <ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia interpersonal 2. Accidentes automotores 3. Autolesiones 4. VIH/SIDA 5. Enfermedad isquémica del corazón 6. Ahogamiento 7. Cirrosis |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>30 a 34 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos dietarios 3. Sobrepeso y obesidad 4. Consumo de tabaco 5. Alta presión arterial 6. Altos niveles de glucosa en la sangre 7. Inactividad física | <ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia interpersonal 2. Accidentes automotores 3. Autolesiones 4. Cirrosis 5. VIH/SIDA 6. Enfermedad isquémica del corazón 7. Insuficiencia Renal Crónica |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>35 a 39 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos dietarios 3. Sobrepeso y obesidad 4. Alta presión arterial 5. Consumo de tabaco 6. Altos niveles de glucosa en la sangre 7. Inactividad física | <ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia interpersonal 2. Accidentes automotores 3. Cirrosis 4. VIH/SIDA 5. Enfermedad isquémica del corazón 6. Autolesiones 7. Insuficiencia Renal Crónica |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>40 a 44 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos dietarios 3. Sobrepeso y obesidad 4. Consumo de tabaco 5. Altos niveles de glucosa en la sangre 6. Alta presión arterial 7. Inactividad física | <ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia interpersonal 2. Accidentes automotores 3. Enfermedad isquémica del corazón 4. Cirrosis 5. VIH/SIDA 6. Insuficiencia Renal Crónica Autolesiones |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>45 a 49 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos dietarios 3. Sobrepeso y obesidad 4. Alta presión arterial 5. Altos niveles de glucosa en la sangre 6. Consumo de tabaco 7. Inactividad física | <ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia interpersonal 2. Enfermedades isquémicas del corazón 3. Accidentes automotores 4. Cirrosis 5. Insuficiencia Renal Crónica 6. Consumo de alcohol 7. VIH/SIDA |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>50 a 69 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Alta presión arterial 3. Sobrepeso y obesidad 4. Altos niveles de glucosa en la sangre 5. Consumo de alcohol 6. Consumo de tabaco 7. Inactividad física | <ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades isquémicas del corazón 2. Diabetes 3. Insuficiencia Renal Crónica 4. Cirrosis 5. Violencia interpersonal 6. Infecciones respiratorias bajas 7. Infarto cerebral |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>70 o más años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Alta presión arterial 3. Altos niveles de glucosa en la sangre 4. Sobrepeso y obesidad 5. Consumo de tabaco 6. Inactividad física 7. Contaminación del aire en el hogar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades isquémicas del corazón 2. Infecciones respiratorias bajas 3. Infarto cerebral 4. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 5. Diabetes 6. Insuficiencia Renal Crónica 7. Cáncer estomacal |