

ESTADOS UNIDOS¹**Indicadores demográficos, 2013**

Población total	320,051 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	79 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) ²	69 años (10 años menos que la EVN)
Mediana de edad	37 años
Esperanza de vida mayores 60 años	23 años
Población mayor de 60 años	20% (64,010 mil habitantes)

Indicadores macroeconómicos, 2013

PIB per cápita por PPA	52,980 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	9,146 dólares
Gasto total en salud % del PIB	17.1%
<i>Gasto Público en salud</i>	8.1%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	2.0%
<i>Otros</i>	7.0%

Indicadores de Desarrollo Humano, 2013

Índice de Desarrollo Humano	0,914 (Desarrollo Humano Alto, lugar 5 de 187)
IDH ajustado por desigualdad	0,755
Coefficiente de Gini 2012	40.8 (Óptimo, menor a 39.0)

Causas de defunción, 2012

Enfermedades transmisibles	6.4%
Enfermedades no transmisibles	84.6%
Traumatismos	9.0%

Principales causas de defunción, 2010

Causa	Defunciones	Porcentaje relativo
1. Enfermedades isquémicas del corazón	562,887	36.0%
2. Infarto cerebral	172,320	11.0%
3. Cáncer de pulmón	163,345	10.4%
4. Enfermedad del alzhéimer	158,281	10.1%
5. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	154,494	9.9%
6. Diabetes	86,057	5.5%
7. Infecciones respiratorias bajas	85,448	5.5%
8. Cáncer de colon	63,909	4.1%
9. Insuficiencia Renal Crónica	60,328	3.9%
10. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias	56,570	3.6%
Total 10 principales causas de muerte	1,563,639	100%

¹ Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas sanitarias Mundiales, OMS

² EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con "total salud", contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
Años de vida saludable perdidos (AVISA)	58,138,835	62,533,712	7.6%	100.0%
Años vividos con discapacidad (AVD)	9,024,797	14,177,009	57.1%	22.7%
Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)	49,114,038	48,356,703	-1.5%	77.3%
Defunciones	2,778,457	2,910,424	4.7%	

Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 37%	1. Consumo de alcohol y drogas 33%
2. <i>Riesgos dietarios</i> 18%	• Consumo de drogas 174%
3. <i>Consumo de tabaco</i> 15%	• Consumo de alcohol 18%
4. <i>Consumo de drogas y alcohol</i> 10%	2. Riesgos fisiológicos -1%
5. <i>Inactividad física</i> 7%	• Baja densidad mineral ósea 149%
6. <i>Lesiones</i> 5%	• Sobrepeso y obesidad 41%
7. <i>Contaminación del aire</i> 3%	• Alta glucosa en la sangre 36%
8. <i>Otros riesgos</i> 5%	3. Deficiencia de vitamina A 58%
Total 100%	

Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

	Factores de riesgo	Causas de defunción
Menores de 5 años	1. Consumo de alcohol	1. Accidentes automotores
	2. Consumo de drogas	2. Anomalías congénitas
	3. Consumo de tabaco	3. Ahogamientos
	4. Deficiencia de zinc	4. Violencia interpersonal
	5. Contaminación de micropartículas en el aire	5. Fuego
	6. Bajo peso para la edad	6. Leucemia
	7. Deficiencia de hierro	7. Meningitis

	Factores de riesgo	Causas de defunción
5 a 9 años	1. Deficiencia de hierro	1. Anemia por deficiencia de hierro
	2. Falta de saneamiento	2. Enfermedad diarreica
	3. Falta de agua potable	3. Malaria
	4. Consumo de alcohol	4. Infecciones respiratorias bajas
	5. Consumo de drogas	5. Accidentes automotores
	6. Abuso sexual infantil	6. Asma
	7. Plomo	7. VIH/SIDA

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>10 a 14 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Deficiencia de hierro</i> 2. <i>Consumo de alcohol</i> 3. <i>Falta de saneamiento</i> 4. <i>Abuso sexual infantil</i> 5. <i>Falta de agua potable</i> 6. <i>Consumo de drogas</i> 7. <i>Plomo</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Trastorno depresivo mayor</i> 2. <i>Anemia por deficiencia de hierro</i> 3. <i>Asma</i> 4. <i>Dolor de espalda baja</i> 5. <i>Accidentes automotores</i> 6. <i>VIH/SIDA</i> 7. <i>Trastorno de ansiedad</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>15 a 19 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de alcohol</i> 2. <i>Riesgos laborales</i> 3. <i>Deficiencia de hierro</i> 4. <i>Violencia de pareja</i> 5. <i>Consumo de drogas</i> 6. <i>Abuso sexual infantil</i> 7. <i>Falta de saneamiento</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Accidentes automotores</i> 2. <i>Trastorno depresivo mayor</i> 3. <i>Dolor de espalda baja</i> 4. <i>Autolesiones</i> 5. <i>Trastorno de ansiedad</i> 6. <i>Violencia interpersonal</i> 7. <i>Anemia por falta de hierro</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>20 a 24 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de alcohol</i> 2. <i>Riesgos laborales</i> 3. <i>Consumo de drogas</i> 4. <i>Deficiencia de hierro</i> 5. <i>Violencia de pareja</i> 6. <i>Abuso sexual infantil</i> 7. <i>Falta de saneamiento</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Accidentes automotores</i> 2. <i>Trastorno depresivo mayor</i> 3. <i>Autolesiones</i> 4. <i>Dolor de espalda baja</i> 5. <i>VIH/SIDA</i> 6. <i>Violencia interpersonal</i> 7. <i>Consumo de drogas</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>25 a 29 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de alcohol</i> 2. <i>Riesgos laborales</i> 3. <i>consumo de drogas</i> 4. <i>Riesgos dietarios</i> 5. <i>Deficiencia de hierro</i> 6. <i>Violencia de pareja</i> 7. <i>Alta presión arterial</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>VIH/SIDA</i> 2. <i>Accidentes automotores</i> 3. <i>Trastorno depresivo mayor</i> 4. <i>Dolor de espalda baja</i> 5. <i>Consumo de drogas</i> 6. <i>Tuberculosis</i> 7. <i>Autolesiones</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>30 a 34 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de alcohol</i> 2. <i>Riesgos laborales</i> 3. <i>Riesgos dietarios</i> 4. <i>Consumo de drogas</i> 5. <i>Consumo de tabaco</i> 6. <i>Alta presión arterial</i> 7. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>VIH/SIDA</i> 2. <i>Accidentes automotores</i> 3. <i>Dolor de espalda baja</i> 4. <i>Trastorno depresivo mayor</i> 5. <i>Tuberculosis</i> 6. <i>Autolesiones</i> 7. <i>Violencia interpersonal</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>35 a 39 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos dietarios 3. Riesgos laborales 4. Consumo de tabaco 5. Alta presión arterial 6. Sobrepeso y obesidad 7. Altos niveles de glucosa en la sangre 	<ol style="list-style-type: none"> 1. VIH/SIDA 2. Dolor de espalda baja 3. Accidentes automotores 4. Trastorno depresivo mayor 5. Tuberculosis 6. Enfermedad isquémica del corazón 7. Autolesiones

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>40 a 44 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Consumo de tabaco 3. Consumo de alcohol 4. Alta presión arterial 5. Riesgos laborales 6. Sobrepeso y obesidad 7. Altos niveles de glucosa en la sangre 	<ol style="list-style-type: none"> 1. VIH/SIDA 2. Dolor de espalda baja 3. Enfermedad isquémica del corazón 4. Accidentes automotores 5. Trastorno depresivo mayor 6. Tuberculosis 7. Infarto cerebral

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>45 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Consumo de tabaco 3. Alta presión arterial 4. Consumo de alcohol 5. Sobrepeso y obesidad 6. Altos niveles de glucosa en la sangre 7. Riesgos laborales 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades isquémicas del corazón 2. Dolor de espalda baja 3. VIH/SIDA 4. Infarto cerebral 5. Trastorno depresivo mayor 6. Accidentes automotores 7. Tuberculosis

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Consumo de tabaco 3. Sobrepeso y obesidad 4. Alta presión arterial 5. Inactividad física 6. Altos niveles de glucosa en la sangre 7. Alto nivel de colesterol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades isquémicas del corazón 2. Cáncer de pulmón 3. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 4. Diabetes 5. Cirrosis 6. Infarto cerebral 7. Cáncer de colon

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Alta presión arterial 3. Consumo de tabaco 4. Sobrepeso y obesidad 5. Inactividad física 6. Altos niveles de glucosa en la sangre 7. Altos niveles de colesterol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades isquémicas del corazón 2. Infarto cerebral 3. Alzheimer 4. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 5. Cáncer de pulmón 6. Infecciones respiratorias bajas 7. Diabetes