

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO

GRANADA¹



Indicadores demográficos, 2013

| | |
|---|------------------------------------|
| Población total | 106 mil habitantes |
| Esperanza de vida al nacer (EVN) | 73 años |
| Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) ² | 62 años (11 años menos que la EVN) |
| Mediana de edad | 26 años |
| Esperanza de vida mayores 60 años | 19 años |
| Población mayor de 60 años | 10% (11 mil habitantes) |

Indicadores macroeconómicos, 2013

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| PIB per cápita por PPA | 11,646 dólares |
| Gasto per cápita en salud por PPA | 729 dólares |
| Gasto total en salud % del PIB | 6.3% |
| <i>Gasto Público en salud</i> | 3.0% |
| <i>Gasto de bolsillo en salud</i> | 3.2% |
| <i>Otros</i> | 0.1% |

Indicadores de Desarrollo Humano, 2013

| | |
|------------------------------|---|
| Índice de Desarrollo Humano | 0,744 (Desarrollo Humano Alto, lugar 79 de 187) |
| IDH ajustado por desigualdad | n. d. |
| Coefficiente de Gini 2012 | n. d. (Óptimo, menor a 39.0) |

Causas de defunción, 2012

| | |
|-------------------------------|-------|
| Enfermedades transmisibles | n. d. |
| Enfermedades no transmisibles | n. d. |
| Traumatismos | n. d. |

Principales causas de defunción, 2010

| Causa | Defunciones | Porcentaje relativo |
|--|-------------|---------------------|
| 1. Enfermedades isquémicas del corazón | 116 | 25.1% |
| 2. Infarto cerebral | 103 | 22.2% |
| 3. Diabetes | 78 | 16.8% |
| 4. Infecciones respiratorias bajas | 50 | 10.8% |
| 5. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias | 30 | 6.5% |
| 6. Enfermedades hipertensivas cardiovasculares | 23 | 5.0% |
| 7. Cáncer de próstata | 21 | 4.5% |
| 8. Insuficiencia Renal Crónica | 16 | 3.5% |
| 9. Accidentes automotores | 13 | 2.8% |
| 10. Cáncer de hígado | 13 | 2.8% |
| Total 10 principales causas de muerte | 463 | 100% |

¹ Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas sanitarias Mundiales, OMS

² EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con "total salud", contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

Impacto de factores de riesgos

| Concepto | 1990 | 2010 | Crecimiento | Porcentaje 2010 |
|--|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| Años de vida saludable perdidos (AVISA) | 21,102 | 22,236 | 5.4% | 100.0% |
| <i>Años vividos con discapacidad (AVD)</i> | 3,600 | 4,947 | 37.4% | 22.2% |
| <i>Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)</i> | 17,502 | 17,289 | -1.2% | 77.8% |
| <i>Defunciones</i> | 770 | 887 | 15.2% | |

Impacto de los principales riesgos prevenibles

| Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010 | Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo |
|--|--|
| 1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 43% | 1. Lesiones 82% |
| 2. <i>Riesgos dietarios</i> 15% | • <i>Violencia interpersonal</i> 207% |
| 3. <i>Consumo de alcohol y drogas</i> 11% | • <i>Accidentes automotores</i> 1% |
| 4. <i>Inactividad física</i> 7% | 2. Consumo de alcohol y drogas 70% |
| 5. <i>Lesiones</i> 6% | • <i>Consumo de alcohol</i> 76% |
| 6. <i>Consumo de tabaco</i> 6% | • <i>Consumo de drogas</i> 74% |
| 7. <i>Desnutrición</i> 5% | 3. Riesgos fisiológicos 29% |
| 8. <i>Otros riesgos</i> 7% | • <i>Sobrepeso y obesidad</i> 89% |
| 100% | • <i>Glucosa en la sangre</i> 75% |

Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|--------------------------|--|---|
| <i>Menores de 5 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> Consumo de drogas Bajo peso para la edad Deficiencia de hierro Deficiencia de zinc Consumo de tabaco (directo e indirecto) Lactancia materna sub-óptima Contaminación ambiental (PM) | <ol style="list-style-type: none"> Infecciones respiratorias bajas Accidentes automotores VIH/SIDA Anomalías congénitas Ahogamiento Encefalopatía neonatal Fuego |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|-------------------|--|--|
| <i>5 a 9 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> Consumo de drogas Deficiencia de hierro Consumo de alcohol Falta de saneamiento Falta de agua potable Abuso sexual infantil | <ol style="list-style-type: none"> Accidentes automotores Ahogamiento Infecciones respiratorias bajas VIH/SIDA Células falciformes Otras enfermedades musculares Anomalías congénitas |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|---------------------|--|---|
| <i>10 a 14 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de drogas 2. Deficiencia de hierro 3. Consumo de alcohol 4. Falta de saneamiento 5. Abuso sexual infantil 6. Falta de agua potable | <ol style="list-style-type: none"> 1. VIH/SIDA 2. Ahogamiento 3. Trastorno depresivo mayor 4. Accidentes automotores 5. Células falciformes 6. Infecciones respiratorias bajas 7. Cirrosis |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|---------------------|--|--|
| <i>15 a 19 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Consumo de drogas 3. Deficiencia de hierro 4. Riesgos laborales 5. Violencia de pareja 6. Abuso sexual infantil 7. Falta de saneamiento | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ahogamiento 2. Accidentes automotores 3. Violencia interpersonal 4. Enfermedades musculares 5. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias 6. Infecciones respiratorias bajas 7. Anomalías congénitas |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|---------------------|--|---|
| <i>20 a 24 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Consumo de drogas 3. Riesgos laborales 4. Deficiencia de hierro 5. Violencia de pareja 6. Abuso sexual infantil 7. Falta de saneamiento | <ol style="list-style-type: none"> 1. Accidentes automotores 2. Ahogamiento 3. Violencia interpersonal 4. VIH/SIDA 5. Infecciones respiratorias bajas 6. Enfermedades musculares 7. Linfoma no hodgkin |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|---------------------|---|--|
| <i>25 a 29 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos dietarios 3. Sobrepeso y obesidad 4. Alta presión arterial 5. Altos niveles de glucosa en la sangre 6. Inactividad física 7. Consumo de drogas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Accidentes automotores 2. Ahogamiento 3. Infecciones respiratorias bajas 4. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias 5. Violencia interpersonal 6. Linfoma no hodgkin 7. Otras enfermedades musculares |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|---------------------|---|---|
| <i>30 a 34 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos dietarios 3. Sobrepeso y obesidad 4. Alta presión arterial 5. Consumo de tabaco 6. Altos niveles de glucosa en la sangre 7. Inactividad física | <ol style="list-style-type: none"> 1. Accidentes automotores 2. Infecciones respiratorias bajas 3. Ahogamiento 4. Linfoma no hodgkin 5. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias 6. Violencia interpersonal 7. VIH/SIDA |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|---------------------|---|---|
| <i>35 a 39 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Sobrepeso y obesidad 3. Riesgos dietarios 4. Alta presión arterial 5. Altos niveles de glucosa en la sangre 6. Consumo de tabaco 7. Inactividad física | <ol style="list-style-type: none"> 1. VIH/SIDA 2. Enfermedad isquémica del corazón 3. Infecciones respiratorias bajas 4. Accidentes automotores 5. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias 6. Diabetes 7. Cirrosis |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|---------------------|---|---|
| <i>40 a 44 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Sobrepeso y obesidad 3. Alta presión arterial 4. Consumo de alcohol 5. Consumo de tabaco 6. Altos niveles de glucosa en la sangre 7. Inactividad física | <ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedad isquémica del corazón 2. VIH/SIDA 3. Infecciones respiratorias bajas 4. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias 5. Accidentes automotores 6. Infarto cerebral 7. Cirrosis |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|---------------------|---|---|
| <i>45 a 49 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Alta presión arterial 3. Sobrepeso y obesidad 4. Altos niveles de glucosa en la sangre 5. Consumo de alcohol 6. Consumo de tabaco 7. Inactividad física | <ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades isquémicas del corazón 2. Infarto cerebral 3. Diabetes 4. Cirrosis 5. Infecciones respiratorias bajas 6. infección renal crónica 7. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|---------------------|---|--|
| <i>50 a 69 años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Alta presión arterial 3. Sobrepeso y obesidad 4. Altos niveles de glucosa en la sangre 5. Consumo de tabaco 6. Inactividad física 7. Consumo de alcohol | <ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades isquémicas del corazón 2. Infarto cerebral 3. Diabetes 4. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias 5. Infecciones respiratorias bajas 6. Cirrosis 7. Enfermedades hipertensivas del corazón |

| | <i>Factores de riesgo</i> | <i>Causas de defunción</i> |
|----------------------|--|--|
| <i>70 o más años</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Alta presión arterial 2. Riesgos dietarios 3. Altos niveles de glucosa en la sangre 4. Sobrepeso y obesidad 5. Inactividad física 6. Contaminación ambiental PM 7. Alto nivel de colesterol | <ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades isquémicas del corazón 2. Infarto cerebral 3. Diabetes 4. Infecciones respiratorias bajas 5. Cáncer de próstata 6. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias 7. Enfermedades hipertensivas del corazón |