

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO

HONDURAS¹



Indicadores demográficos, 2013

Población total	8,098 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	74 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) ²	64 años (10 años menos que la EVN)
Mediana de edad	22 años
Esperanza de vida mayores 60 años	22 años
Población mayor de 60 años	7% (567 mil habitantes)

Indicadores macroeconómicos, 2013

PIB per cápita por PPA	4,292 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	400 dólares
Gasto total en salud % del PIB	8.7%
<i>Gasto Público en salud</i>	4.3%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	3.9%
<i>Otros</i>	0.5%

Indicadores de Desarrollo Humano, 2013

Índice de Desarrollo Humano	0,617 (Desarrollo Humano Alto, lugar 129 de 187)
IDH ajustado por desigualdad	0,418
Coefficiente de Gini 2012	57,0 (Óptimo, menor a 39.0)

Causas de defunción, 2012

Enfermedades transmisibles	18.4%
Enfermedades no transmisibles	68.9%
Traumatismos	12.7%

Principales causas de defunción, 2010

Causa	Defunciones	Porcentaje relativo
1. Enfermedad isquémica del corazón	156,113	19.9%
2. Parto prematuro	91,576	11.7%
3. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	78,275	10.0%
4. Trastorno depresivo	78,271	10.0%
5. Enfermedad diarreica	77,451	9.9%
6. Anomalías congénitas	67,473	8.6%
7. VIH/SIDA	63,625	8.1%
8. Infecciones respiratorias bajas	62,661	8.0%
9. Dolor de espalda baja	54,552	7.0%
10. Anemia por deficiencia de hierro	53,895	6.9%
Total 10 principales causas de muerte	783,892	100%

¹ Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas sanitarias Mundiales, OMS

² EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con "total salud", contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
Años de vida saludable perdidos (AVISA)	1,094,989	1,322,144	20.7%	100.0%
<i>Años vividos con discapacidad (AVD)</i>	126,115	226,888	79.9%	17.2%
<i>Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)</i>	968,874	1,095,256	13.0%	82.8%
<i>Defunciones</i>	23,873	41,276	72.9%	

Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 24%	1. Riesgo fisiológico 130%
2. <i>Lesiones</i> 16%	• <i>Sobrepeso y obesidad</i> 239%
3. <i>Riesgos dietarios</i> 13%	• <i>Alta presión arterial</i> 119%
4. <i>Riesgos laborales</i> 8%	• <i>Alta glucosa en ayuno</i> 114%
5. <i>Contaminación del aire</i> 8%	2. Consumo de alcohol y drogas 112%
6. <i>Consumo de alcohol y drogas</i> 7%	• <i>Consumo de drogas</i> 189%
7. <i>Consumo de tabaco</i> 5%	• <i>Consumo de alcohol</i> 105%
8. <i>Otros riesgos</i> 19%	3. Lesiones 108%
100%	4. Riesgos dietarios 100%

Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>Menores de 5 años</i>	1. <i>Bajo peso para la edad</i>	1. <i>Enfermedades diarreicas</i>
	2. <i>Deficiencia de zinc</i>	2. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	3. <i>Contaminación del aire en el hogar</i>	3. <i>Violencia interpersonal</i>
	4. <i>Lactancia materna sub-óptima</i>	4. <i>Desnutrición</i>
	5. <i>Deficiencia de vitamina A</i>	5. <i>Asma</i>
	6. <i>Consumo de tabaco (directo e indirecto)</i>	6. <i>Ahogamientos</i>
	7. <i>Falta de saneamiento</i>	7. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>5 a 9 años</i>	1. <i>Consumo de alcohol</i>	1. <i>Accidentes automotores</i>
	2. <i>Deficiencia de hierro</i>	2. <i>Enfermedad diarreica</i>
	3. <i>Falta de agua potable</i>	3. <i>Violencia interpersonal</i>
	4. <i>Falta de saneamiento</i>	4. <i>Ahogamiento</i>
	5. <i>Consumo de drogas</i>	5. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	6. <i>Abuso sexual infantil</i>	6. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i>
		7. <i>Leucemia</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>10 a 14 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Deficiencia de hierro 3. Falta de agua potable 4. Falta de saneamiento 5. Consumo de drogas 6. Abuso sexual infantil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia interpersonal 2. Accidentes Automotores 3. Ahogamiento 4. Enfermedad diarreica 5. Enfermedad isquémica del corazón 6. Infarto cerebral 7. infecciones respiratorias bajas

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>15 a 19 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos laborales 2. Consumo de alcohol 3. Violencia de pareja 4. Deficiencia de hierro 5. Consumo de drogas 6. Abuso sexual infantil 7. Falta de agua potable 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia interpersonal 2. Accidentes automotores 3. Autolesión 4. Ahogamiento 5. Enfermedad isquémica del corazón 6. Epilepsia 7. Trastorno maternal

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>20 a 24 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos laborales 2. Consumo de alcohol 3. Violencia de pareja 4. Consumo de drogas 5. Deficiencia de hierro 6. Abuso sexual infantil 7. Falta de agua potable 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia interpersonal 2. Accidentes automotores 3. Autolesiones 4. VIH/SIDA 5. Enfermedad isquémica del corazón 6. Trastorno maternal 7. Ahogamiento

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>25 a 29 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos laborales 2. Consumo de alcohol 3. Riesgos dietarios 4. Contaminación del aire del hogar 5. Sobrepeso y obesidad 6. Alta presión arterial 7. Inactividad física 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia interpersonal 2. VIH/SIDA 3. Accidentes automotores 4. Enfermedad isquémica del corazón 5. Autolesiones 6. Trastorno maternal 7. Infarto cerebral

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>30 a 34 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos laborales 2. Riesgos dietarios 3. Consumo de alcohol 4. Contaminación del aire del hogar 5. Sobrepeso y obesidad 6. Consumo de tabaco 7. Alta presión arterial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia interpersonal 2. VIH/SIDA 3. Accidentes automotores 4. Enfermedad isquémica del corazón 5. Infarto cerebral 6. Autolesiones 7. Cirrosis

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>35 a 39 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos laborales 2. Riesgos dietarios 3. Consumo de alcohol 4. Sobrepeso y obesidad 5. Alta presión arterial 6. Contaminación del aire del hogar 7. Consumo de tabaco 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia interpersonal 2. VIH/SIDA 3. Enfermedad isquémica del corazón 4. Accidentes automotores 5. Infarto cerebral 6. Trastorno maternal 7. Autolesiones

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>40 a 44 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Riesgos laborales 3. Sobrepeso y obesidad 4. Alta presión arterial 5. Consumo de alcohol 6. Contaminación del aire del hogar 7. Consumo de tabaco 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia interpersonal 2. VIH/SIDA 3. Enfermedad isquémica del corazón 4. Accidentes automotores 5. Infarto cerebral 6. Cirrosis 7. Enfermedad diarreica

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>45 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Alta presión arterial 3. Sobrepeso y obesidad 4. Riesgos laborales 5. Contaminación del aire del hogar 6. Consumo de tabaco 7. consumo de alcohol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. VIH/SIDA 2. Enfermedad isquémica del corazón 3. Violencia interpersonal 4. Infarto cerebral 5. Accidentes automotores 6. Cirrosis 7. Enfermedad diarreica

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Alta presión arterial 3. Sobrepeso y obesidad 4. Contaminación del aire en el hogar 5. Consumo de tabaco 6. Altos niveles de glucosa en la sangre 7. Inactividad física 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades isquémicas del corazón 2. Infarto cerebral 3. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 4. Cirrosis 5. Diabetes 6. Violencia interpersonal 7. Cáncer de estómago

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alta presión arterial 2. Riesgos dietarios 3. Contaminación del aire en el hogar 4. Consumo de tabaco 5. Inactividad física 6. Sobrepeso y obesidad 7. Altos niveles de glucosa en la sangre 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades isquémicas del corazón 2. Infarto cerebral 3. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 4. Infecciones respiratorias bajas 5. Enfermedades diarreicas 6. Diabetes 7. Enfermedades hipertensivas del corazón