

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO
SUBREGIÓN AMERICA LATINA Y EL CARIBE¹

Indicadores demográficos, 2013	
Población total	609,921 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	74.6 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) ²	64.2 años (10.4 años menos que la EVSN)
Mediana de edad	27.9 años
Esperanza de vida mayores 60 años	21.3 años
Población mayor de 60 años	10.6% (64,878 mil habitantes)
Indicadores macroeconómicos, 2013	
PIB per cápita	13,651.3 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	940.5 dólares
Gasto total en Salud % del PIB	7.4%
<i>Gasto Público en salud</i>	4.4%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	2.4%
<i>Otros</i>	0.6%
Indicadores de Desarrollo Humano, 2013	
Índice de Desarrollo Humano	0,747
IDH ajustado por desigualdad	0,571
Coefficiente de Gini 2012	53.3 (Óptimo, menor a 39.0)
Causas, 2012	
Enfermedades transmisibles	14.7%
Enfermedades no transmisibles	73.9%
Traumatismos	11.4%

Principales Causas, 2010

Causa	Defunciones	Porcentaje
1. Enfermedades isquémicas del corazón	466,663	24.1%
2. Infarto cerebral	322,737	16.6%
3. Infecciones respiratorias bajas	193,177	10.0%
4. Diabetes	166,421	8.6%
5. Fuerzas de la naturaleza	183,317	9.5%
6. Violencia intrafamiliar	149,502	7.7%
7. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	130,308	6.7%
8. Insuficiencia Renal Crónica	113,381	5.8%
9. Accidentes automotores	109,561	5.7%
10. Cirrosis	103,487	5.3%
Total 10 principales Causas	1,938,554	100.0%

¹ La subregión América Latina y el Caribe incluye información disponible de los países de la clasificación del Banco Mundial para dicha subregión.

² EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con “total salud”, contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
Años de vida saludable perdidos (AVISA)	94,370,250	107,336,292	13.7%	100.0%
<i>Años vividos con discapacidad (AVD)</i>	13,189,185	21,963,435	66.5%	20.5%
<i>Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)</i>	81,181,065	85,372,857	5.2%	79.5%
<i>Defunciones</i>	2,485,093	3,634,446	46.2%	

Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 32%	1. Riesgos fisiológicos 73%
2. <i>Riesgos dietarios</i> 14%	• <i>Sobrepeso y obesidad</i> 140%
3. <i>Lesiones</i> 13%	• <i>Niveles altos de glucosa en la sangre</i> 101%
4. <i>Consumo de alcohol y drogas</i> 12%	2. Consumo de alcohol y drogas 55%
5. <i>Consumo de tabaco</i> 8%	• <i>Consumo de alcohol</i> 53%
6. <i>Inactividad física</i> 5%	• <i>Consumo de drogas</i> 83%
7. <i>Riesgos laborales</i> 4%	3. Lesiones 40%
8. <i>Otros riesgos</i> 12%	• <i>Accidentes automotores</i> 40%
Total 100%	• <i>Violencia interpersonal</i> 40%

Años de vida saludable perdidos 2013

	Factores de riesgo	Causas
<i>Menores de 5 años</i>	1. <i>Bajo peso para la edad</i>	1. <i>Trastorno neonatal</i>
	2. <i>Falta de agua potable y saneamiento</i>	2. <i>Enfermedad diarreica</i>
	3. <i>Contaminación del aire</i>	3. <i>Enfermedades no trasmisibles</i>
	4. <i>Abuso sexual</i>	4. <i>Guerras y desastres</i>
	5. <i>Consumo de tabaco</i>	5. <i>Lesiones accidentales</i>
	6. <i>Bajo índice de filtración glomerular</i>	6. <i>Deficiencias nutricionales</i>
	7. <i>Consumo de alcohol y drogas</i>	7. <i>Diabetes</i>

	Factores de riesgo	Causas
<i>5 a 14 años</i>	1. <i>Falta de agua potable y saneamiento</i>	1. <i>Guerras y desastres</i>
	2. <i>Consumo de alcohol y drogas</i>	2. <i>Accidentes en transportes</i>
	3. <i>Índice de filtración glomerular</i>	3. <i>Lesiones accidentales</i>
	4. <i>Contaminación del aire</i>	4. <i>Enfermedad diarreica</i>
	5. <i>Abuso sexual</i>	5. <i>Neoplasma</i>
	6. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i>	6. <i>Auto lesión y violencia interpersonal</i>
	7. <i>Bajo peso para la edad</i>	7. <i>Enfermedades no trasmisibles</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas</i>
<i>15 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol y drogas 2. Riesgos dietarios 3. Sobrepeso y obesidad 4. Alta presión arterial 5. Consumo de tabaco 6. Abuso sexual 7. Alto nivel de glucosa en la sangre 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auto violencia y violencia interpersonal 2. Guerra y desastre 3. Enfermedades cardiovasculares 4. Neoplasma 5. Accidentes en transportes 6. Lesiones accidentales 7. Diabetes

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Alta presión arterial 3. Sobrepeso y obesidad 4. Consumo de tabaco 5. Alto nivel de glucosa en la sangre 6. Consumo de drogas y alcohol 7. Alto nivel de colesterol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades cardiovasculares 2. Neoplasma 3. Diabetes 4. Cirrosis 5. Enfermedades crónico respiratorias 6. Enfermedad diarreica 7. Guerras y desastres

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Alta presión arterial 3. Altos nivel de glucosa en la sangre 4. Sobrepeso y obesidad 5. Consumo de tabaco 6. Bajo índice de filtración glomerular 7. Alto nivel de colesterol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades cardiovasculares 2. Neoplasma 3. Diabetes 4. Enfermedades crónico respiratorias 5. Enfermedad diarreica 6. Trastorno neurológico 7. Enfermedades digestivas