

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO
SUBREGIÓN AMÉRICA DEL NORTE¹

Indicadores demográficos, 2013	
Población total	355,233 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	79.3 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) ²	69.3 años (10 años menos que la EVN)
Mediana de edad	37.3 años
Esperanza de vida mayores 60 años	24.8 años
Población mayor de 60 años	20% (71,398 mil habitantes)
Indicadores macroeconómicos, 2013	
PIB per cápita por PPA	51,995 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	8,712 dólares
Gasto total en salud % del PIB	13.9%
<i>Gasto Público en salud</i>	7.8%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	1.8%
<i>Otros</i>	4.3%
Indicadores de Desarrollo Humano, 2013	
Índice de Desarrollo Humano	0,913
IDH ajustado por desigualdad	0,755
Coefficiente de Gini 2012	40.0 (Óptimo, menor a 39.0) ³
Causas, 2012	
Enfermedades transmisibles	6.3%
Enfermedades no transmisibles	85.1%
Traumatismos	8.6%

Principales Causas, 2010

Causas	Defunciones	Porcentaje
1. Enfermedades isquémicas del corazón	619,299	35.9%
2. Infarto cerebral	191,463	11.1%
3. Cáncer de pulmón	182,692	10.6%
4. Alzheimer	175,300	10.2%
5. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	167,552	9.7%
6. Diabetes	94,934	5.5%
7. Infecciones respiratorias bajas	93,871	5.4%
8. Cáncer de colon	72,887	4.2%
9. Enfermedades cardiovasculares	61,313	3.6%
10. Otras enfermedades	65,936	3.8%
Total 10 principales Causas	1,725,247	100.0%

Impacto de factores de riesgos

¹ La subregión América del Norte incluye información disponible de Canadá y Estados Unidos de América.

² EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con “total salud”, contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

³ Promedio simple para el cálculo subregional.

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
Años de vida saludable perdidos (AVISA)	63,198,530	68,108,003	7.8%	100.0%
<i>Años vividos con discapacidad (AVD)</i>	9,995,813	15,732,484	57.4%	23.1%
<i>Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)</i>	53,202,717	52,375,519	-1.6%	76.9%
<i>Defunciones</i>	3,016,640	3,180,196	5.4%	

Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 37%	1. Agua y saneamiento 703%
2. <i>Riesgos dietarios</i> 18%	• <i>Falta de agua potable</i> 699%
3. <i>Inactividad física</i> 7%	• <i>Falta de saneamiento</i> 457%
4. <i>Consumo de tabaco</i> 3%	
5. <i>Lesiones</i> 2%	2. Consumo de alcohol y drogas 32%
6. <i>Riesgos laborales</i> 2%	• <i>Consumo de alcohol</i> 17%
7. <i>Otros riesgos</i> 31%	• <i>Consumo de drogas</i> 167%
Total 100%	

Años de vida saludable perdidos 2013

<i>Menores de 5 años</i>	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas</i>
	1. <i>Bajo peso para la edad</i> 2. <i>Consumo de alcohol y drogas</i> 3. <i>Bajo índice de filtración glomerular</i> 4. <i>Abuso sexual</i> 5. <i>Contaminación del aire</i> 6. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i> 7. <i>Falta de agua y saneamiento</i>	1. <i>Trastorno neonatal</i> 2. <i>Enfermedades no transmisibles</i> 3. <i>Lesiones accidentales</i> 4. <i>Enfermedad diarreica</i> 5. <i>Accidentes en los trasportes</i> 6. <i>Diabetes</i> 7. <i>Neoplasma</i>

<i>5 a 14 años</i>	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas</i>
	1. <i>Consumo de alcohol y drogas</i> 2. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 3. <i>Bajo índice de filtración glomerular</i> 4. <i>Abuso sexual y violencia</i> 5. <i>Contaminación del aire</i> 6. <i>Falta de agua potable y saneamiento</i> 7. <i>Alta presión arterial</i>	1. <i>Accidentes en los trasportes</i> 2. <i>Neoplasma</i> 3. <i>Lesiones accidentales</i> 4. <i>Auto lesiones y violencia interpersonal</i> 5. <i>Enfermedades no transmisibles</i> 6. <i>Diabetes</i> 7. <i>Enfermedad diarreica</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas</i>
<i>15 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de drogas y alcohol</i> 2. <i>Riesgos dietarios</i> 3. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 4. <i>Consumo de tabaco</i> 5. <i>Alta presión arterial</i> 6. <i>Alto nivel de colesterol</i> 7. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Neoplasma</i> 2. <i>Autolesiones y violencia interpersonal</i> 3. <i>Enfermedades cardiovasculares</i> 4. <i>Accidentes en los trasportes</i> 5. <i>Trastorno mental y uso de sustancias</i> 6. <i>Diabetes</i> 7. <i>Lesiones accidentales</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de tabaco</i> 2. <i>Riesgos dietarios</i> 3. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 4. <i>Alta presión arterial</i> 5. <i>Consumo de alcohol y drogas</i> 6. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i> 7. <i>Alto nivel de colesterol</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Neoplasma</i> 2. <i>Enfermedades cardiovasculares</i> 3. <i>Diabetes</i> 4. <i>Enfermedades crónico respiratorias</i> 5. <i>Cirrosis</i> 6. <i>Trastorno neurológico</i> 7. <i>Autolesiones y violencia interpersonal</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Alta presión arterial</i> 3. <i>Consumo de tabaco</i> 4. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 5. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i> 6. <i>Alto nivel de colesterol</i> 7. <i>Bajo índice de filtración glomerular</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enfermedades cardiovasculares</i> 2. <i>Neoplasma</i> 3. <i>Trastorno neurológico</i> 4. <i>Enfermedades crónico respiratorias</i> 5. <i>Diabetes</i> 6. <i>Enfermedad diarreica</i> 7. <i>Lesiones accidentales</i>