

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO  
SUBREGIÓN AMÉRICA DEL SUR<sup>1</sup>

<b>Indicadores demográficos, 2013</b>	
Población total	269,637 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	73.8 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) <sup>2</sup>	65.5 años (8.3 años menos que la EVN)
Mediana de edad	30.2 años
Esperanza de vida mayores 60 años	22.1 años
Población mayor de 60 años	11.8% (31,915 mil habitantes)
<b>Indicadores macroeconómicos, 2013</b>	
PIB per cápita por PPA	16,074 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	1,492 dólares
Gasto total en salud % del PIB	<b>8.5%</b>
<i>Gasto Público en salud</i>	4.6%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	2.7%
<i>Otros</i>	1.2%
<b>Indicadores de Desarrollo Humano, 2013</b>	
Índice de Desarrollo Humano	0,756
IDH ajustado por desigualdad	0,570
Coefficiente de Gini 2012	51.2 (Óptimo, menor a 39.0) <sup>3</sup>
<b>Causas, 2012</b>	
Enfermedades transmisibles	11.0%
Enfermedades no transmisibles	77.2%
Traumatismos	11.8%

**Principales Causas, 2010**

Causas	Defunciones	Porcentaje relativo
1. Infarto cerebral	187,851	21.9%
2. Enfermedades isquémicas del corazón	172,696	20.1%
3. Infecciones respiratorias bajas	94,437	11.0%
4. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica	70,704	8.2%
5. Diabetes	69,098	8.1%
6. Violencia interpersonal	61,630	7.2%
7. Accidentes automotores	45,232	5.3%
8. Enfermedad hipertensiva del corazón	43,775	5.1%
9. Insuficiencia Renal Crónica	36,586	4.3%
10. Otras enfermedades	76,164	8.8%
<b>Total 10 principales Causas</b>	<b>858,173</b>	<b>100.0%</b>

<sup>1</sup> La subregión Cono Sur incluye información disponible de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

<sup>2</sup> EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con “total salud”, contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

<sup>3</sup> Promedio simple para el cálculo subregional.

### Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
<b>Años de vida saludable perdidos (AVSA)</b>	<b>44,650,280</b>	<b>52,409,974</b>	<b>17.4%</b>	<b>100.0%</b>
<i>Años vividos con discapacidad (AVD)</i>	7,009,420	10,634,505	51.7%	20.3%
<i>Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)</i>	37,640,860	41,775,469	11.0%	79.7%
<i>Defunciones</i>	1,293,094	1,855,799	43.5%	

### Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 38%	1. <b>Lesiones</b> <b>47%</b>
2. <i>Riesgos dietarios</i> 17%	• <i>Accidentes automotores</i> 73%
3. <i>Consumo de tabaco</i> 13%	• <i>Violencia interpersonal</i> 23%
4. <i>Lesiones</i> 7%	2. <b>Riesgos fisiológicos</b> <b>23%</b>
5. <i>Inactividad física</i> 6%	• <i>Sobrepeso y obesidad</i> 67%
6. <i>Riesgos laborales</i> 4%	• <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i> 31%
7. <i>Otros riesgos</i> 15%	• <i>Baja densidad mineral ósea</i> 17%
<b>Total</b> <b>100%</b>	

### Años de vida saludable perdidos, 2013

	Factores de riesgo	Causas
Menos de 5 años	1. <i>Bajo peso para la edad</i>	1. <i>Trastorno neonatal</i>
	2. <i>Falta de agua potable y saneamiento</i>	2. <i>Enfermedades no transmisibles</i>
	3. <i>Bajo índice de filtración glomerular</i>	3. <i>Enfermedad diarreica</i>
	4. <i>Relaciones sexuales inseguras</i>	4. <i>Lesiones accidentales</i>
	5. <i>Consumo de tabaco</i>	5. <i>Diabetes</i>
	6. <i>Contaminación del aire</i>	6. <i>Deficiencias nutricionales</i>
	7. <i>Consumo de alcohol y drogas</i>	7. <i>Neoplasma</i>
	8. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i>	8. <i>Accidentes en transportes</i>
	9. <i>Alta presión arterial</i>	9. <i>Enfermedades cardiovasculares</i>
	10. <i>Otros riesgos ambientales</i>	10. <i>Trastorno neurológico</i>

	Factores de riesgo	Causas
5 a 14 años	1. <i>Bajo peso para la edad</i>	1. <i>Trastorno mental y consumo de sustancias</i>
	2. <i>Bajo índice de filtración glomerular</i>	2. <i>Enfermedades no transmisibles</i>
	3. <i>Consumo de alcohol y drogas</i>	3. <i>Deficiencias nutricionales</i>
	4. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i>	4. <i>Enfermedades crónico respiratorias</i>
	5. <i>Falta de agua potable y saneamiento</i>	5. <i>Diabetes</i>
	6. <i>Alta presión arterial</i>	6. <i>Lesiones accidentales</i>
	7. <i>Abuso sexual y Violencia</i>	7. <i>Neoplasma</i>
	8. <i>Relaciones sexuales inseguras</i>	8. <i>Accidentes en transportes</i>
	9. <i>Contaminación del aire</i>	9. <i>Trastorno neurológico</i>
	10. <i>Consumo de tabaco</i>	10. <i>Trastorno neonatal</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas</i>
<i>15 a 49 años</i>	1. <i>Consumo de alcohol y drogas</i>	1. <i>Trastorno mental y consumo de sustancias</i>
	2. <i>Sobrepeso y obesidad</i>	2. <i>Enfermedades musculares</i>
	3. <i>Riesgos dietarios</i>	3. <i>Enfermedades no transmisibles</i>
	4. <i>Consumo de tabaco</i>	4. <i>Neoplasma</i>
	5. <i>Alta presión arterial</i>	5. <i>Autolesiones y violencia</i>
	6. <i>Riesgos laborales</i>	6. <i>Accidentes en transportes</i>
	7. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i>	7. <i>Enfermedades cardiovasculares</i>
	8. <i>Relaciones sexuales inseguras</i>	8. <i>Diabetes</i>
	9. <i>Bajo índice de filtración glomerular</i>	9. <i>Lesiones accidentales</i>
	10. <i>Abuso sexual y violencia</i>	10. <i>Trastornos neurológicos</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas</i>
<i>50 a 69 años</i>	1. <i>Consumo de tabaco</i>	1. <i>Neoplasma</i>
	2. <i>Riesgos dietarios</i>	2. <i>Enfermedades cardiovasculares</i>
	3. <i>Sobrepeso y obesidad</i>	3. <i>Enfermedades musculares</i>
	4. <i>Alta presión arterial</i>	4. <i>Diabetes</i>
	5. <i>Consumo de alcohol y drogas</i>	5. <i>Enfermedades crónico respiratorias</i>
	6. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i>	6. <i>Trastorno mental y consumo de sustancias</i>
	7. <i>Altos niveles de colesterol</i>	7. <i>Enfermedades no transmisibles</i>
	8. <i>Bajo índice de filtración glomerular</i>	8. <i>Cirrosis</i>
	9. <i>Actividad física baja</i>	9. <i>Lesiones accidentales</i>
	10. <i>Riesgos laborales</i>	10. <i>Trastornos neurológicos</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas</i>
<i>70 años o más</i>	1. <i>Alta presión arterial</i>	1. <i>Enfermedades cardiovasculares</i>
	2. <i>Riesgos dietarios</i>	2. <i>Neoplasma</i>
	3. <i>Consumo de tabaco</i>	3. <i>Enfermedades crónico respiratorias</i>
	4. <i>Sobrepeso y obesidad</i>	4. <i>Trastornos neurológicos</i>
	5. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i>	5. <i>Diabetes</i>
	6. <i>Bajo índice de filtración glomerular</i>	6. <i>Enfermedades no transmisibles</i>
	7. <i>Consumo de alcohol y drogas</i>	7. <i>Enfermedad diarreica</i>
	8. <i>Altos niveles de colesterol</i>	8. <i>Enfermedades musculares</i>
	9. <i>Actividad física baja</i>	9. <i>Lesiones accidentales</i>
	10. <i>Contaminación del aire</i>	10. <i>Enfermedades digestivas</i>