

**Indicadores demográficos, 2013**

Población total	3,864 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	77 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) <sup>2</sup>	67 años (10 años menos que la EVN)
Mediana de edad	28 años
Esperanza de vida mayores 60 años	24 años
Población mayor de 60 años	10% (386 mil habitantes)

**Indicadores macroeconómicos, 2013**

PIB per cápita por PPA	19,416 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	796 dólares
Gasto total en salud % del PIB	<b>7.2%</b>
<i>Gasto Público en salud</i>	4.9%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	1.8%
<i>Otros</i>	0.5%

**Indicadores de Desarrollo Humano, 2013**

Índice de Desarrollo Humano	0,765 (Desarrollo Humano Alto, lugar 65 de 187)
IDH ajustado por desigualdad	0,596
Coefficiente de Gini 2012	51,9 (Óptimo, menor a 39.0)

**Causas de defunción, 2012**

Enfermedades transmisibles	16.4%
Enfermedades no transmisibles	70.9%
Traumatismos	12.7%

**Principales causas de defunción, 2010**

Causa	Defunciones	Porcentaje relativo
1. Enfermedad isquémica del corazón	2,409	25.4%
2. Infarto cerebral	1,890	20.0%
3. <b>Diabetes</b>	<b>941</b>	<b>9.9%</b>
4. VIH/SIDA	848	9.0%
5. Infecciones respiratorias bajas	713	7.5%
6. <b>Insuficiencia Renal Crónica</b>	<b>672</b>	<b>7.1%</b>
7. Accidentes automotores	591	6.2%
8. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	548	5.8%
9. Violencia interpersonal	492	5.2%
10. Cáncer de pulmón	362	3.8%
<b>Total 10 principales causas de muerte</b>	<b>9,466</b>	<b>100%</b>

<sup>1</sup> Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas sanitarias Mundiales, OMS

<sup>2</sup> EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con "total salud", contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

### Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
<b>Años de vida saludable perdidos (AVISA)</b>	<b>310,277</b>	<b>500,245</b>	<b>61.2%</b>	<b>100.0%</b>
<i>Años vividos con discapacidad (AVD)</i>	62,446	120,251	92.6%	24.0%
<i>Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)</i>	247,831	379,994	53.3%	76.0%
<i>Defunciones</i>	9,824	17,371	76.8%	

### Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 34%	1. <b>Riesgo fisiológico</b> <b>134%</b>
2. <i>Riesgos dietarios</i> 14%	• <i>Sobrepeso y obesidad</i> 214%
3. <i>Lesiones</i> 11%	• <i>Alta glucosa en la sangre</i> 139%
4. <i>Consumo de alcohol y drogas</i> 10%	• <i>Alta presión arterial</i> 60%
5. <i>Desnutrición</i> 8%	2. <b>Consumo de alcohol y drogas</b> <b>64%</b>
6. <i>Consumo de tabaco</i> 6%	• <i>Consumo de drogas</i> 155%
7. <i>Inactividad física</i> 5%	• <i>Consumo de alcohol</i> 57%
8. <i>Otros riesgos</i> 12%	3. <b>Riesgos dietarios</b> <b>50%</b>
100%	4. <b>Consumo de tabaco</b> <b>41%</b>

### Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

	Factores de riesgo	Causas de defunción
Menores de 5 años	1. <i>Bajo peso para la edad</i>	1. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	2. <i>Deficiencia de zinc</i>	2. <i>Desnutrición</i>
	3. <i>Contaminación del aire en el hogar</i>	3. <i>Enfermedades diarreicas</i>
	4. <i>Lactancia materna sub-óptima</i>	4. <i>Anomalías congénitas</i>
	5. <i>Consumo de tabaco (directo e indirecto)</i>	5. <i>Ahogamientos</i>
	6. <i>Deficiencia de hierro</i>	6. <i>Accidentes automovilísticos</i>
	7. <i>Consumo de drogas</i>	7. <i>VIH/SIDA</i>

	Factores de riesgo	Causas de defunción
5 a 9 años	1. <i>Consumo de alcohol</i>	1. <i>VIH/SIDA</i>
	2. <i>Deficiencia de hierro</i>	2. <i>Accidentes automotores</i>
	3. <i>Falta de saneamiento</i>	3. <i>Ahogamiento</i>
	4. <i>Consumo de drogas</i>	4. <i>Anomalías congénitas</i>
	5. <i>Falta de agua potable</i>	5. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	6. <i>Abuso sexual infantil</i>	6. <i>Enfermedad diarreica</i>
		7. <i>Leucemia</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>10 a 14 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Consumo de drogas</li> <li>3. Deficiencia de hierro</li> <li>4. Falta de saneamiento</li> <li>5. Abuso sexual infantil</li> <li>6. Falta de agua potable</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIH/SIDA</li> <li>2. Accidentes Automotores</li> <li>3. Ahogamiento</li> <li>4. Leucemia</li> <li>5. Anomalías congénitas</li> <li>6. Autolesiones</li> <li>7. Violencia interpersonal</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>15 a 19 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos laborales</li> <li>3. Consumo de drogas</li> <li>4. Violencia de pareja</li> <li>5. Abuso sexual infantil</li> <li>6. Deficiencia de hierro</li> <li>7. Falta de saneamiento</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Violencia interpersonal</li> <li>2. VIH/SIDA</li> <li>3. Accidentes automotores</li> <li>4. Autolesión</li> <li>5. Ahogamiento</li> <li>6. Leucemia</li> <li>7. Infecciones respiratorias bajas</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>20 a 24 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos laborales</li> <li>3. Violencia de pareja</li> <li>4. Consumo de drogas</li> <li>5. Abuso sexual infantil</li> <li>6. Deficiencia de hierro</li> <li>7. Falta de saneamiento</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Violencia interpersonal</li> <li>2. Accidentes automotores</li> <li>3. Autolesiones</li> <li>4. VIH/SIDA</li> <li>5. Ahogamiento</li> <li>6. Trastorno materna</li> <li>7. Infecciones respiratorias bajas</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>25 a 29 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos laborales</li> <li>3. Riesgos dietarios</li> <li>4. Sobrepeso y obesidad</li> <li>5. Consumo de drogas</li> <li>6. Violencia de pareja</li> <li>7. Alta presión arterial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Violencia interpersonal</li> <li>2. Accidentes automotores</li> <li>3. VIH/SIDA</li> <li>4. Autolesiones</li> <li>5. Ahogamiento</li> <li>6. Trastorno maternal</li> <li>7. Infecciones respiratorias bajas</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>30 a 34 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos laborales</li> <li>3. Riesgos dietarios</li> <li>4. Consumo de drogas</li> <li>5. Sobrepeso y obesidad</li> <li>6. Alta presión arterial</li> <li>7. Consumo de tabaco</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIH/SIDA</li> <li>2. Violencia interpersonal</li> <li>3. Accidentes automotores</li> <li>4. Autolesiones</li> <li>5. Ahogamiento</li> <li>6. Enfermedad isquémica del corazón</li> <li>7. Trastorno maternal</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>35 a 39 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos dietarios</li> <li>3. Riesgos laborales</li> <li>4. Sobrepeso y obesidad</li> <li>5. Alta presión arterial</li> <li>6. Consumo de drogas</li> <li>7. Altos niveles de glucosa en la sangre</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIH/SIDA</li> <li>2. Violencia interpersonal</li> <li>3. Accidentes automotores</li> <li>4. Autolesiones</li> <li>5. Enfermedad isquémica del corazón</li> <li>6. Ahogamiento</li> <li>7. Infecciones respiratorias bajas</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>40 a 44 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos dietarios</li> <li>3. Sobrepeso y obesidad</li> <li>4. Alta presión arterial</li> <li>5. Consumo de tabaco</li> <li>6. Riesgos laborales</li> <li>7. Altos niveles de glucosa en la sangre</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIH/SIDA</li> <li>2. Accidentes automotores</li> <li>3. Violencia interpersonal</li> <li>4. Enfermedad isquémica del corazón</li> <li>5. Infarto cerebral</li> <li>6. Autolesiones</li> <li>7. Insuficiencia Renal Crónica</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>45 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riesgos dietarios</li> <li>2. Alta presión arterial</li> <li>3. Sobrepeso y obesidad</li> <li>4. Consumo de alcohol</li> <li>5. Altos niveles de glucosa en la sangre</li> <li>6. Consumo de tabaco</li> <li>7. Inactividad física</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIH/SIDA</li> <li>2. Enfermedad isquémica del corazón</li> <li>3. Accidentes automotores</li> <li>4. Infarto cerebral</li> <li>5. Insuficiencia Renal Crónica</li> <li>6. Violencia interpersonal</li> <li>7. Diabetes</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riesgos dietarios</li> <li>2. Alta presión arterial</li> <li>3. Sobrepeso y obesidad</li> <li>4. Altos niveles de glucosa en la sangre</li> <li>5. Consumo de tabaco</li> <li>6. Inactividad física</li> <li>7. Consumo de alcohol</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enfermedades isquémicas del corazón</li> <li>2. Infarto cerebral</li> <li>3. Diabetes</li> <li>4. Insuficiencia Renal Crónica</li> <li>5. Cáncer de pulmón</li> <li>6. Accidentes automotores</li> <li>7. Cáncer de estómago</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riesgos dietarios</li> <li>2. Alta presión arterial</li> <li>3. Altos niveles de glucosa en la sangre</li> <li>4. Sobrepeso y obesidad</li> <li>5. Consumo de tabaco</li> <li>6. Inactividad física</li> <li>7. Altos niveles de colesterol</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enfermedades isquémicas del corazón</li> <li>2. Infarto cerebral</li> <li>3. Diabetes</li> <li>4. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)</li> <li>5. Infecciones respiratorias bajas</li> <li>6. Insuficiencia Renal Crónica</li> <li>7. Cáncer de pulmón</li> </ol>