

SANTA LUCÍA¹**Indicadores demográficos, 2013**

Población total	182 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	75 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) ²	63 años (12 años menos que la EVN)
Mediana de edad	31 años
Esperanza de vida mayores 60 años	21 años
Población mayor de 60 años	12% (22 mil habitantes)

Indicadores macroeconómicos, 2013

PIB per cápita por PPA	10, 488 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	898 dólares
Gasto total en salud % del PIB	8.5%
<i>Gasto Público en salud</i>	4.7%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	3.6%
<i>Otros</i>	0.2%

Indicadores de Desarrollo Humano, 2013

Índice de Desarrollo Humano	0,714 (Desarrollo Humano Alto, lugar 97 de 187)
IDH ajustado por desigualdad	n. d.
Coefficiente de Gini 2012	n. d. (Óptimo, menor a 39.0)

Causas de defunción, 2012

Enfermedades transmisibles	n. d.
Enfermedades no transmisibles	n. d.
Traumatismos	n. d.

Principales causas de defunción, 2010

Causa	Defunciones	Porcentaje relativo
1. Infarto cerebral	162	24.8%
2. Diabetes	136	20.9%
3. Enfermedad isquémica del corazón	126	19.3%
4. Infecciones respiratorias bajas	49	7.5%
5. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias	37	5.7%
6. Cáncer de próstata	37	5.7%
7. Enfermedades hipertensivas cardiovasculares	33	5.1%
8. Accidentes automotores	25	3.8%
9. Violencia interpersonal	26	4.0%
10. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	21	3.2%
Total 10 principales causas de muerte	652	100%

¹ Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas sanitarias Mundiales, OMS

² EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con "total salud", contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
Años de vida saludable perdidos (AVISA)	30,395	32,541	7.0%	100.0%
Años vividos con discapacidad (AVD)	5,520	8,706	57.7%	26.8%
Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)	24,875	23,835	-4.2%	73.2%
Defunciones	1,088	1,288	18.4%	

Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 38%	1. Consumo de drogas 145%
2. <i>Riesgos dietarios</i> 19%	2. Riesgos fisiológicos 9%
3. <i>Consumo de tabaco</i> 15%	• <i>Sobrepeso y obesidad</i> 54%
4. <i>Inactividad física</i> 7%	• <i>Alta glucosa en ayuno</i> 26%
6. <i>Lesiones</i> 4%	3. Lesiones 7%
7. <i>Riesgos laborales</i> 3%	• <i>Accidentes automotores</i> 2%
8. <i>Otros riesgos</i> 14%	• <i>Violencia interpersonal</i> 24%
100%	

Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

	Factores de riesgo	Causas de defunción
Menores de 5 años	1. <i>Bajo peso para la edad</i>	1. <i>Anomalías congénitas</i>
	2. <i>Consumo de drogas</i>	2. <i>VIH/SIDA</i>
	3. <i>Consumo de tabaco (directo e indirecto)</i>	3. <i>Accidentes automotores</i>
	4. <i>Deficiencia de hierro</i>	4. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	5. <i>Deficiencia de zinc</i>	5. <i>Fuego</i>
	6. <i>Lactancia materna sub-óptima</i>	6. <i>Ahogamientos</i>
	7. <i>Consumo de alcohol</i>	7. <i>Meningitis</i>

	Factores de riesgo	Causas de defunción
5 a 9 años	1. <i>Deficiencia de hierro</i>	1. <i>Accidentes automotores</i>
	2. <i>Consumo de alcohol</i>	2. <i>Anomalías congénitas</i>
	3. <i>Consumo de drogas</i>	3. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	4. <i>Falta de saneamiento</i>	4. <i>Ahogamiento</i>
	5. <i>Falta de agua potable</i>	5. <i>Células falciformes</i>
	6. <i>Abuso sexual infantil</i>	6. <i>VIH/SIDA</i>
		7. <i>Diabetes</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>10 a 14 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de alcohol</i> 2. <i>Consumo de drogas</i> 3. <i>Deficiencia de hierro</i> 4. <i>Falta de saneamiento</i> 5. <i>Abuso sexual infantil</i> 6. <i>Falta de agua potable</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>VIH/SIDA</i> 2. <i>Accidentes Automotores</i> 3. <i>Ahogamiento</i> 4. <i>Fuerzas de la naturaleza</i> 5. <i>Anomalías congénitas</i> 6. <i>Violencia interpersonal</i> 7. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>15 a 19 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de alcohol</i> 2. <i>Riesgos laborales</i> 3. <i>Violencia de pareja</i> 4. <i>Consumo de drogas</i> 5. <i>Deficiencia de hierro</i> 6. <i>Abuso sexual infantil</i> 7. <i>Falta de saneamiento</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Violencia interpersonal</i> 2. <i>Accidentes automotores</i> 3. <i>Ahogamiento</i> 4. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 5. <i>Fuerzas de la naturaleza</i> 6. <i>Enfermedades cardiovasculares y circulatorias</i> 7. <i>Autolesiones</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>20 a 24 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de alcohol</i> 2. <i>Violencia de pareja</i> 3. <i>Riesgos laborales</i> 4. <i>Consumo de drogas</i> 5. <i>Deficiencia de hierro</i> 6. <i>Abuso sexual infantil</i> 7. <i>Falta de saneamiento</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Violencia interpersonal</i> 2. <i>Accidentes automotores</i> 3. <i>Ahogamiento</i> 4. <i>Autolesiones</i> 5. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 6. <i>Fuerzas de la naturaleza</i> 7. <i>Enfermedades cardiovasculares y circulatorias</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>25 a 29 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de alcohol</i> 2. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 3. <i>Riesgos dietarios</i> 4. <i>Alta presión arterial</i> 5. <i>Violencia de pareja</i> 6. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i> 7. <i>Riesgos laborales</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Violencia interpersonal</i> 2. <i>Accidentes automotores</i> 3. <i>VIH/SIDA</i> 4. <i>Autolesiones</i> 5. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 6. <i>Ahogamiento</i> 7. <i>Fuerzas de la naturaleza</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>30 a 34 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de alcohol</i> 2. <i>Riesgos dietarios</i> 3. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 4. <i>Alta presión arterial</i> 5. <i>Consumo de tabaco</i> 6. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 7. <i>Inactividad física</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Violencia interpersonal</i> 2. <i>Accidentes automotores</i> 3. <i>VIH/SIDA</i> 4. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 5. <i>Autolesiones</i> 6. <i>Ahogamiento</i> 7. <i>Enfermedades cardiovasculares y circulatorias</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>35 a 39 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Sobrepeso y obesidad 3. Riesgos dietarios 4. Alta presión arterial 5. Altos niveles de glucosa en la sangre 6. Consumo de tabaco 7. Inactividad física 	<ol style="list-style-type: none"> 1. violencia interpersonal 2. Accidentes automotores 3. VIH/SIDA 4. Diabetes 5. Infecciones respiratorias bajas 6. Ahogamiento 7. Cirrosis

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>40 a 44 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Sobrepeso y obesidad 3. Riesgos dietarios 4. Consumo de tabaco 5. Alta presión arterial 6. Altos niveles de glucosa en la sangre 7. Inactividad física 	<ol style="list-style-type: none"> 1. VIH/SIDA 2. Diabetes 3. Violencia interpersonal 4. Enfermedad isquémica del corazón 5. Cirrosis 6. Cáncer de mama 7. Infarto cerebral

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>45 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Sobrepeso y obesidad 3. Alta presión arterial 4. Consumo de alcohol 5. Altos niveles de glucosa en la sangre 6. Consumo de tabaco 7. Inactividad física 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedad isquémica del corazón 2. Diabetes 3. Infarto cerebral 4. Cirrosis 5. VIH/SIDA 6. Violencia interpersonal 7. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Alta presión arterial 3. Sobrepeso y obesidad 4. Altos niveles de glucosa en la sangre 5. Consumo de alcohol 6. Consumo de tabaco 7. Inactividad física 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades isquémicas del corazón 2. Diabetes 3. Infarto cerebral 4. Cirrosis 5. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias 6. Cáncer de mama 7. Cáncer de hígado

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alta presión arterial 2. Riesgos dietarios 3. Altos niveles de glucosa en la sangre 4. Sobrepeso y obesidad 5. Consumo de tabaco 6. Inactividad física 7. Contaminación del aire del hogar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infarto cerebral 2. Diabetes 3. Enfermedad isquémica del corazón 4. Infecciones respiratorias bajas 5. Cáncer de próstata 6. Enfermedad hipertensiva del corazón 7. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias